

Sobre la pérdida auditiva

¿Qué es pérdida auditiva?

La pérdida auditiva es la incapacidad total o parcial de la habilidad para escuchar sonidos en uno o ambos oídos.

Los términos “perdida de la audición”, “discapacidad auditiva”, “problemas de audición” y “sordera” son todos usados para describir la habilidad limitada para oír todos los sonidos en nuestro idioma. Las limitaciones auditivas afectan directamente la habilidad para entender e imitar el habla y desarrollar patrones naturales del habla.

Las definiciones brindadas por el gobierno federal son más específicas. Por ejemplo, “discapacidad auditiva” está definida como “IDEA” (individuos con discapacidades educativas) como un impedimento en la audición, ya sea permanente o fluctuante que afecta adversamente el rendimiento académico del niño. “Sordera” se define como “discapacidad auditiva severa donde el niño es incapaz de procesar información lingüística a través del oído con o sin amplificación.

Por lo tanto, la sordera puede ser vista como una condición médica que impide que un niño reciba sonido en todas o la mayoría de las formas. En contraste, un niño con “pérdida auditiva” o “discapacidad auditiva” pueden regularmente responder a sonidos, incluyendo lenguaje hablado, a pesar de que la información que reciben tal vez no sea completamente entendible.

En bebés, la pérdida auditiva ocurre con más frecuencia que cualquier otra condición médica. Por esta razón, una prueba auditiva para un recién nacido está disponible y necesaria. En personas mayores, la pérdida auditiva es la tercera enfermedad crónica más común, después de la hipertensión y artritis.

La pérdida auditiva puede ser temporaria o permanente. Puede ser hereditaria o puede tener causas ambientales. Puede afectar ambos oídos (bilateral), o solo uno (unilateral). La pérdida auditiva puede variar de leve, moderado o severo a profunda.

Consulte la guía de recursos pediátricos para la infancia, niñez de pérdida de audición, para hechos sobre la prevalencia de la pérdida auditiva, su efecto sobre el lenguaje y la comunicación, mandatos legislativos para EHDl (Principios de detección auditiva e intervención) y los beneficios de la identificación y el tratamiento temprano.

Lista de verificación auditiva

Ningún bebe es demasiado joven para tener una prueba auditiva, de hecho, la audición puede ser probada durante las primeras horas de vida. Casi de 1 de cada 350 bebés nace con una pérdida auditiva significativa, mientras que otros pueden llegar a ser sordos por enfermedades o lesiones de la infancia. Revisa los recursos abajo y aprende más acerca la detención y diagnóstico proporcionado por la Clínica de Audiología auditiva de la comunidad.

[Etapas de desarrollo auditivo \(PDF\)](#)

[Procedimientos para la revisión diaria de los aparatos \(PDF\)](#)

Enlaces de pérdida auditiva

[Academia Americana de Pediatría: La pérdida de audición neonatal e infantil: Detección e Intervención](#)

[Centro para la pérdida de audición en los niños: Hospital de investigación Boystown](#)

[Centro de Audición, habla y sordera](#)

[Centro nacional para la evaluación y gestión de la audición](#)

[Liga para los de audio restringido](#)

[Medica Natus \(proporciona dispositivos médicos y apoyo a los niños nacidos con trastornos\)](#)

[Detención temprana de audición e intervención \(EHDI\)](#)

[Evaluación de la audición de recién nacidos de california](#)